

METAREX[®] ONE

Esca Granulare per il controllo di lumache e chiocciole

METAREX[®] ONE – COMPOSIZIONE

- Metaldeide pura g 2.5
- Coformulanti* q.b. a g 100

*contiene denatonio benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio.

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

PRODOTTO DESTINATO AGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI

CONSIGLI DI PRUDENZA: P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280: Indossare guanti protettivi. P391: Raccogliere il prodotto fuoriuscito. P301+P310: In caso di ingestione: contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. P411: Conservare a temperature non superiori a 30°C P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale.

DE SANGOSSE S.A.S. – CS10005 Bonnel – 47480 PONT-DU-CASSE - Francia
Tel. 00(33)5.53.69.36.30

Autorizzazione Ministero della Salute n. 17651 del 18.03.2021

Stabilimento di Produzione: De Sangosse SAS – Borie Industries, rue des Entrepreneurs 3 – Z.A. de Borie – 47480 - Pont-Du-Casse - Francia

Taglie: 1 – 5 – 10 – 12 – 15 – 18 – 20 – 25 – 200 – 300 – 400 – 500 – 1000 kg

Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE:

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso o consultare un Centro Anti-Veleni.

CARATTERISTICHE

METAREX ONE è un prodotto per il controllo di lumache e chiocciole in colture in pieno campo, orticoltura, produzione di frutta, colture ornamentali e in serre. METAREX[®] ONE è un molluscicida che agisce quando ingerito dai parassiti.

MODALITÀ DI IMPIEGO

METAREX[®] ONE è particolarmente adatto ad un'applicazione centrifuga. I mezzi utilizzati sono distributori centrifughi, sia con monodischi elettrici, sia con due dischi che funzionano con presa di potenza (spandiconcime). Questi ultimi sono solitamente più efficaci.

In ogni caso, occorre:

- regolare correttamente lo spandiconcime (rispettare le istruzioni di esercizio)
- rispettare la dose scelta ed applicarla in modo uniforme (senza sovradosaggio o sottodosaggio)
- limitare la rottura dei granuli
- curare l'applicazione del prodotto in bordura dei campi per evitare le proiezioni al di fuori dei limiti della parcella trattata

Monitoraggio della popolazione attiva di lumache e chiocciole: È indispensabile osservare la popolazione infestante prima di decidere di applicare un anti-limacce. Per valutare l'attività delle lumache è possibile usare vari mezzi ma è raccomandato l'uso di trappole apposite per i parassiti e di un protocollo preciso. Il monitoraggio delle chiocciole necessita mezzi diversi.

Scelta della dose di impiego: La dose scelta deve tener conto della quantità di parassiti da controllare.

Applicare il prodotto per gli usi e alle condizioni descritte di seguito:

Colture	Bersagli	Dose massima d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Fase di crescita	Zona cuscinetto acquatica (metri)
In pieno campo					
Fragole	Lumache e chiocciole	5 kg/ha per spargimento o sul solco	4	Dal trapianto ⁽¹⁾ fino alla fine della fioritura (BBCH69)	5 metri
Colture oleaginose: (lino, papavero, sesamo, girasole, colza, soia, senape, cotone, zucca, cartamo, borragine, camelina, canapa, ricino), altre oleaginose escluse le arachidi	Lumache e chiocciole	5 kg/ha per spargimento o 4 kg/ha sul solco di semina o in miscelazione alla semente	4	Dalla semina ⁽¹⁾ fino alle 7 foglie aperte (BBCH17)	5 metri
Cereali a paglia (grano, segale, orzo, avena)	Lumache e chiocciole	5 kg/ha per spargimento o 4 kg/ha sul solco di semina o in miscelazione alla semente	4	Dalla semina ⁽¹⁾ fino all'inizio levata (BBCH30)	5 metri
Patata	Lumache e chiocciole	5 kg/ha per spargimento	4	Dalla semina ⁽¹⁾ fino alla senescenza	5 metri

Colture	Bersagli	Dose massima d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Fase di crescita	Zona cuscinetto acquatica (metri)
Barbabetola (da zucchero, foraggio, ortaggio), rapa e rutabaga e mais, mais dolce, miglio, sorgo, legumi freschi (fagiolini, fagioli senza baccello, piselli con baccello, piselli, lenticchie fresche) e legumi secchi (piselli, fagioli, lenticchie, lupino)	Lumache e chioccioline	5 kg/ha per spargimento o 4 kg/ha sul solco di semina o in miscelazione alla semente	4	Dalla semina ⁽¹⁾ fino alle 5 foglie aperte (BBCH15)	5 metri
Brassicaceae (cavolfiori, broccoli, cavoli, cavolini di Bruxelles)		5 kg/ha per spargimento	4	Dalla semina ⁽¹⁾ fino all'inizio dello sviluppo delle teste (BBCH40)	5 metri
Lattuga e altre insalate (lattuga, scarola, mastica, ecc., comprese Brassicaceae), spinaci e simili (spinaci, portulaca, barbabetola a foglia, ecc.) e erbe aromatiche (erba cipollina, prezzemolo e altre erbe consumate fresche)	Lumache e chioccioline	5 kg/ha per spargimento	4	Dalla semina ⁽¹⁾ fino alla fine della fase di rosetta o elongazione del germoglio principale (BBCH40)	5 metri
Carciofo		5 kg/ha per spargimento	4	Dalla semina ⁽¹⁾ fino all'apparizione dei capolini (BBCH39)	5 metri
Alberi da frutta (agrumi, pomacee, drupacee, frutta a guscio) e vite (uva da vino e uva da tavola), fragole, bacche e piccoli frutti (more, lampogni, mirtilli, ribes rossi e neri, ecc.)	Lumache e chioccioline	5 kg/ha per spargimento o sul solco	4	Dal trapianto ⁽¹⁾ fino alla fine della fioritura (BBCH69)	5 metri
Prati	Lumache e chioccioline	5 kg/ha per spargimento o 4 kg/ha in miscelazione alla semente	4	Dalla semina ⁽¹⁾ fino a 5 foglie sviluppate	5 metri
Tappeti erbosi	Lumache e chioccioline	5 kg/ha	4	In qualsiasi fase ⁽¹⁾	5 metri
Colture floreali ed ornamentali	Lumache e chioccioline	5 kg/ha	4	In qualsiasi fase ⁽¹⁾	5 metri
In serra					
Fragole	Lumache e chioccioline	5 kg/ha per spargimento o sul solco	4	Dal trapianto ⁽¹⁾ fino alla fine della fioritura (BBCH69)	5 metri
Lattuga e altre insalate (lattuga, scarola, mastica, ecc., comprese Brassicaceae), spinaci e simili (spinaci, portulaca, barbabetola a foglia, ecc.) ed erbe aromatiche (erba cipollina, prezzemolo e altre erbe consumate fresche)	Lumache e chioccioline	5 kg/ha per spargimento	4	Dalla semina ⁽¹⁾ fino alla fine della fase di rosetta o elongazione del germoglio principale (BBCH40)	5 metri
Colture floreali ed ornamentali	Lumache e chioccioline	5 kg/ha	4	In qualsiasi fase ⁽¹⁾	5 metri

(1) Intervento possibile fino a 7 giorni prima della semina o della piantagione

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per la patata e 49 giorni prima del pascolo per i prati.

AVVERTENZE: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto a temperature inferiori a 30°C.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore dei contenitori da 200 a 1000 kg deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.