

# AZUFRIL SC

**FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)****Meccanismo d'azione: FRAC M2**

Registrazione del Ministero della Salute n. 18457 del 09/01/2024

**Composizione****ZOLFO puro g. 56,1 (= 800 g/l)**  
**Coformulanti q. b. a g. 100****AFEPASA Azufrera y Fertilizantes Pallarés, S.A.**Pol. Ind. de Constantí, Av. De Europa, 1-7  
43120 Constantí - Tarragona (Spagna)  
T. +34 977 524 650Distribuito da: **ASCENZA Italia S.r.l.** – via Varese 25/G  
21047 Saronno (VA) - Tel. 0284944669

Stabilimento di produzione:

**AFEPASA Azufrera y Fertilizantes Pallarés, S.A.**  
Constantí, Tarragona (Spagna)

Contenuto netto: 0,100-0,250-0,500-1-5-10-20 L Partita n.

**INDICAZIONI DI PERICOLO: ---****CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.****INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.****PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per proteggere gli artropodi non bersaglio :****- Nell'impiego su cereali rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m da zona non coltivata o in alternativa utilizzare ugelli che riducano la deriva dell'80%****- Negli impieghi su vite, ribes nero e lampone rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 m da zona non coltivata o in alternativa utilizzare ugelli che riducano la deriva dell'85%****- Negli impieghi su pomacee, drupacee, avocado, mango, papaya, nocciolo e ornamentali rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 15m da zona non coltivata o in alternativa utilizzare ugelli che riducano la deriva dell'88,5%.****INFORMAZIONI PER IL MEDICO****In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.****Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.****CARATTERISTICHE**

AZUFRIL SC è un fungicida a base di zolfo in sospensione concentrata specifico per il controllo dell'oidio sulle colture di vite, pomacee, drupacee, frutti tropicali, carciofo, peperone, salsefrica, ribes nero e lampone, nocciolo, sedano, pomodoro, melanzana, cereali, floreali, ornamentali, alberi e arbusti ornamentali.

**DOSE E MODALITÀ D'IMPIEGO**

AZUFRIL SC può essere impiegato sulle seguenti colture ai seguenti dosaggi:

Coltura	Malattia	Epoca d'impiego	Dose (L/ha)	N° max applicazioni	Intervallo minimo tra le applicazioni	Intervallo di sicurezza
VITE	Oidio ( <i>Erysiphe necator</i> )	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi a partire dalla fase di 5-8 foglie distese (BBCH 15-18)	12,5	8	7 giorni	5 giorni
POMACEE (melo, pero, cotogne, nespole, nespole del Giappone)	Oidio ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi fino ad inizio fioritura (BBCH 01-60) e dopo la caduta petali (BBCH >69)	7,5	6	10 giorni	3 giorni
DRUPACEE (pesche, nettarine, albicocche)	Oidio ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> <i>Podosphaera leucotricha</i> )	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi dopo la caduta petali (BBCH >69)	7,5	6	10 giorni	3 giorni
AVOCADO, MANGO, PAPAIA	Oidio	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi dopo la caduta petali (BBCH >69)	7,5	6	10 giorni	3 giorni
CARCIOFO	Oidio	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi	6,0	6	10 giorni	3 giorni
PEPERONE	Oidio ( <i>Leveillula</i> sp.)	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi	2,0	6	10 giorni	3 giorni
SALSEFRICA	Oidio ( <i>Erysiphe</i> sp.)	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi	6,0	6	10 giorni	3 giorni
RIBES NERO e LAMPONE	Oidio ( <i>Sphaerotheca mors-uvae</i> )	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi	3,0	6	10 giorni	3 giorni
NOCCILO	Oidio ( <i>Erysiphe suffulta</i> / <i>Phyllactinia suffulta</i> )	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi	1,0	11	10 giorni	3 giorni
SEDANO	Oidio	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi	6,0	6	10 giorni	3 giorni
POMODORO E MELANZANA	Oidio ( <i>Leveillula taurica</i> )	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi	2	6	10 giorni	3 giorni
FRUMENTO	Oidio ( <i>Blumeria graminis</i> )	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi	10	2	14 giorni	35 giorni
FLOREALI, ORNAMENTALI, ALBERI E ARBUSTI ORNAMENTALI	Oidio ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	Trattamenti preventivi al manifestarsi delle condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia o alla comparsa dei primi sintomi	3	5	10 giorni	---

**COMPATIBILITÀ:** AZUFRIL SC non è compatibile con antiparassitari alcalini, con oli minerali e captano. Il prodotto deve essere irrorato a distanza di almeno 3 settimane dall'impiego di oli minerali e captano.**Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**Etichetta/foglio illustrativo**

**FITOTOSSICITÀ:** Nei periodi di temperature più elevate evitare di applicare il prodotto nelle ore più calde e soleggiate della giornata.

**ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI  
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
DA NON VENDERSI SFUSO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

<h1>AZUFRIL SC</h1> <p><b>FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)</b> <b>Meccanismo d'azione: FRAC M2</b> Registrazione del Ministero della Salute n. 18457 del 09/01/2024</p>		
<b>Composizione</b> ZOLFO puro                   g. 56,1 (= 800 g/l) Coformulanti q. b. a      g. 100		<b>Contenuto netto: 100 ml</b>  <b>Partita n.</b>
<p><b><u>AFEPASA Azufrera y Fertilizantes Pallarés, S.A.</u></b> Pol. Ind. de Constantí, Av. De Europa, 1-7 43120 Constantí - Tarragona (Spagna) T. +34 977 524 650</p> <p>Distribuito da: <b>ASCENZA Italia S.r.l.</b> – via Varese 25/G 21047 Saronno (VA) - Tel. 0284944669</p> <p>Stabilimento di produzione: <b>AFEPASA Azufrera y Fertilizantes Pallarés, S.A.</b> Constantí, Tarragona (Spagna)</p>		
<p><b>INDICAZIONI DI PERICOLO: ---</b> <b>CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.</b> <b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO</b> <b>IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO</b> <b>IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO</b> <b>NELL'AMBIENTE</b></p>		