

VERIN

DISERBANTE SELETTIVO IN EMULSIONE CONCENTRATA
(MECCANISMO D'AZIONE HRAC E)

VERIN – Registrazione Ministero della Salute n. 11654 del 18/04/2003

Composizione - 100 g di prodotto contengono:
Oxifluorfen puro g. 22 (= 240 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

LAINCO S.A.

Avda. Bizet 8-12 - E 08191 Rubí (Barcelona) – Spagna

Tel. +34 93.586.20.15

Distribuito da: **SCAM S.p.A.** - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: **LAINCO S.A.** - Avda. Bizet 8-12 (Pol. Ind. Can Jardí), 08191 Rubí (Barcelona) – Spagna

CONTENUTO: 0,5-1-5-10 L

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. **Danni al SNC:** vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. **Muscoli:** dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. **Exitus per collasso vascolare periferico.**

Terapia: Sintomatica. **Ospedalizzare.** **Controindicazioni:** non provocare il vomito.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE

VERIN è un diserbante selettivo per il diserbo di colture arboree ed erbacee, vivai di piante ornamentali e forestali, nonché argini, aree industriali e civili, bordi stradali, sedi ferroviarie. Agisce nei confronti delle infestanti essenzialmente per contatto; la sua efficacia e persistenza d'azione vengono esaltate durante il periodo autunno-primaverile. Controlla numerose malerbe, sia a foglia larga quali Amarantho (*Amaranthus spp.*), Anagallide (*Anagallis arvensis*), Chenopodio (*Chenopodium spp.*), Crisantemo (*Chrysanthemum spp.*), Stramonio (*Datura stramonium*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Miagro (*Myragrum spp.*), Erba mercorella (*Mercurialis annua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Poligoni (*Poligonum spp.*), Lattaiola (*Picris echinoides*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Rafano (*Raphanus raphanistrum*), Rapistro (*Raphistrum rugosum*), Romici (*Rumex spp.*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Grespino (*Souchus oleraceus*), Erba strega (*Stachys spp.*), Veronica (*Veronica spp.*), Spino d'asino (*Xanthium spp.*), ecc. che graminacee del tipo Avena (*Avena spp.*), Coda di volpe (*Alopecurus spp.*), Lollo (*Lolium spp.*), ecc.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO:

Modalità di applicazione: in tutte le colture il prodotto deve essere impiegato solo con applicazioni in bande lungo la fila nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio.

Impiegare esclusivamente in bande sottochioma lungo i filari (non trattare l'area tra le fila).

L'area delle bande trattate non deve superare il 30% della superficie totale.

Vite, Melo, Pero, Pesco, Albicocco, Susino, Arancio, Limone, Pompelmo, Mandorlo, Nocciolo: trattare durante la fase di dormienza della coltura, dall'autunno all'inizio della primavera.

a) **Pre-emergenza delle infestanti:** il prodotto va impiegato preferibilmente nel tardo autunno-inizio inverno o a fine inverno su terreno lavorato, privo di infestanti emerse alla dose di 2 L/ha* di superficie effettivamente trattata.

b) **Post-emergenza delle infestanti:** VERIN deve essere impiegato alla dose di 2 L/ha* di superficie effettivamente trattata in miscela con erbicidi ad attività fogliare (dipiridilici, ecc.).

c) **Post-emergenza su graminacee perenni:** in presenza di *Cynodon spp.*, *Agropyron spp.*, *Agrostis spp.*, *Bromus spp.*, utilizzare VERIN alla dose di 2 L/ha* di superficie effettivamente trattata in miscela con graminicidi specifici. Intervenire su infestanti sufficientemente sviluppate ed in fase di attiva crescita.

Olivo: **Pre e Post-emergenza delle infestanti:** Effettuare il trattamento alla

dose di 2 L/ha* di superficie effettivamente trattata intervenendo tra l'inizio del viraggio del colore dei frutti da verde cupo a verde chiaro, giallastro fino ad una settimana prima della raccolta oppure effettuare il trattamento, alla dose di 2 L/ha* di superficie effettivamente trattata nel periodo compreso tra la fase di dormienza della coltura e l'inizio della primavera.

Girasole: Il prodotto può essere impiegato su colture seminate a file di almeno 70-75 cm di larghezza, con applicazioni in bande di 25-30 cm di larghezza. Intervenire in pre-emergenza della coltura alla dose di 1L/ha di superficie effettivamente trattata. Piogge violente durante l'emergenza possono produrre temporanei effetti fitotossici sulle prime foglie che scompaiono in breve tempo.

* la dose di impiego di 2 L/ha di superficie effettivamente trattata corrisponde a 600 ml di prodotto per ettaro (meno di 150 g di sostanza attiva ad ettaro)

Su tutte le colture effettuare massimo un trattamento per anno.

COMPATIBILITÀ: VERIN è compatibile con formulati a base di Triazine, Glifosate, Glifosate-trimesio, Glufosinate-ammonio.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Negli interventi su Vite, Pomacee, Drupacee, Mandorlo, Nocciolo deve essere prestata particolare attenzione a non colpire la vegetazione, direttamente o per deriva, delle colture poiché, se inavvertitamente bagnata, potrà dare origine a necrosi localizzate dei tessuti. Tale fenomeno può verificarsi anche in concomitanza di violente precipitazioni che determinano schizzi di terreno contenenti l'erbicida sull'apparato fogliare; di norma non si hanno conseguenze sullo sviluppo e sulla produttività della coltura. Impiegare impianti di distribuzione operanti a basse pressioni e muniti di ugelli antideriva. Non applicare VERIN con temperature superiori a 25° al fine di evitare fenomeni di deriva ed evaporazione che potrebbero dare luogo a fitotossicità.

Su olivo sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta.

Al momento della raccolta, evitare che le drupe entrino a contatto con il terreno

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO